

INFORMATIEFOLDER

Bronchoscopische
Long Volume Reductie
met
VENTIELEN



Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Algemeen

- Longemfyseem
- Behandel mogelijkheden voor longemfyseem

3. De behandeling met ventielen

- Werking behandeling met ventielen
- Welke longkwab wordt afgesloten
- Lekkage tussen kwabben
- Meting van lekkage tussen kwabben
- Plaatsing van de ventielen

4. Uitkomsten van de behandeling met ventielen

- Resultaten en complicaties
- Klaplong
- Alternatieven voor een behandeling met ventielen

5. Opname in het UMCG

6. Na de behandeling met ventielen

- Mogelijke klachten na de behandeling
- Leefregels na ontslag
- Controle visites in het UMCG

7. Contact

1. Inleiding

Naar aanleiding van uw second opinion consult in het UMCG, komt u mogelijk in aanmerking voor een bronchoscopische long volume reductie behandeling met ventielen. In deze informatiefolder leest u wat het doel van de behandeling is, hoe de behandeling in zijn werk gaat, welke complicaties er kunnen optreden en hoe het verder gaat na de behandeling. Deze informatiefolder kan u helpen om te beslissen of u de behandeling met ventielen zou willen ondergaan indien u in aanmerking komt voor de ventielen. Bij deze folder behoort ook de informatie voor patiënten en toestemmings-verklaring “Bronchoscopische longvolume reductie behandeling met éénrichtingsventielen”, die u apart van ons ontvangt.

2. Algemeen

Longemfyseem

Longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide, ons ‘uitlaatgas’. Bij longemfyseem gaan er steeds meer longblaasjes stuk. De wanden van de longblaasjes raken zo beschadigd dat ze niet meer goed werken. Longblaasjes die zijn beschadigd, kunnen niet meer herstellen. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen. Patiënten met ernstig emfyseem zijn als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt in al hun dagelijkse activiteiten.

Behandel mogelijkheden voor longemfyseem


De huidige behandel mogelijkheden zijn stoppen met roken, optimale medicatie, goede voeding, longrevalidatie en mogelijk zuurstof. Voor een kleine groep patiënten is de behandeling met ventielen, een longtransplantatie, longvolumereductie chirurgie of non-invasieve beademing (NIV) een mogelijkheid. De behandeling met ventielen wordt sinds eind 2017 vergoed door de zorgverzekeraars, alleen in daartoe gespecialiseerde ziekenhuizen.

3. De behandeling met ventielen

De behandeling met ventielen wordt uitgevoerd met behulp van een bronchoscoop. Een bronchoscoop is een dun slangetje met daarin een kleine camera die in de luchtwegen gebracht kan worden. Er vindt dus geen operatie plaats. De bronchoscopie zal plaatsvinden onder narcose.


Werking behandeling met ventielen

Door het plaatsen van ventielen, wordt het meest aangedane longdeel (kwab) afgesloten, hierdoor zal het “restvolume” (dit is de hoeveelheid lucht in de longen welke u niet gebruikt) kleiner worden, waardoor het “bruikbare” longvolume groter wordt. Deze afname van het “restvolume” kan in patiënten met emfyseem leiden tot een afname van de kortademigheid en verbeteringen van de longfunctie, het inspanningsvermogen en kwaliteit van leven.



Ventielen

De ventielen zijn gemaakt van nikkel-titanium met een laagje siliconen, wat over het algemeen goed verdragen wordt door het lichaam. Aan het uiteinde zit een siliconen ventiel, die bij inademen gesloten blijft en bij uitademen open gaat en daardoor lucht en slijm naar buiten laat gaan. Doordat lucht uit de longkwab gaat, maar er geen lucht in kan gaan, zal de longkwab kleiner worden.



Uitademing: open ventiel



Inademing: dicht ventiel

Welke kwab wordt afgesloten

De longen bestaan uit 5 delen, ook wel (long)kwabben. De rechter long bestaat uit 3 kwabben; de bovenkwab, de middenkwab en de onderkwab. De linkerlong bestaat uit twee delen: de bovenkwab en de onderkwab. Door het plaatsen van de ventielen wordt de kwab veel kleiner, de overgebleven kwabben zullen iets groter worden om de ruimte in de borstkas op te vullen. Het is niet mogelijk om meerdere kwabben af te sluiten omdat de ruimte in de borstkas dan niet voldoende opgevuld kan worden door de overgebleven kwabben. Hierdoor wordt de kans op een klaplong veel groter. Daarnaast moet er voldoende longweefsel overblijven om zuurstof uit de lucht op te kunnen nemen in het bloed.

De enige uitzondering hierop is dat in sommige gevallen naast de rechter bovenkwab ook de rechter middenkwab erbij afgesloten wordt. Op basis van de CT scan wordt na gegaan welke kwab afgesloten wordt. De longarts van het UMCG zal met u bespreken welke kwab bij u geschikt is voor de behandeling met ventielen.

Lekkage tussen kwabben

Op een CT scan is na te gaan of de scheidingslijn tussen de behandelkwab en aangrenzende kwab intact is, bij circa 2 van de 3 mensen zit er een opening in deze scheidingslijn. Deze opening zit er al vanaf de geboorte. Als de opening vrij groot is er kan lucht doorheen stromen (lekkage), en dan kan de behandelkwab nooit kleiner worden omdat er dan lucht vanuit de aangrenzende kwab in de behandelkwab blijft stromen. We zullen tijdens de bronchoscopie, voorafgaand aan de plaatsing van de ventielen ook meten (Chartis meting) of er daadwerkelijk geen lekkage is. De behandeling met ventielen is alleen effectief indien er geen lekkage is tussen de behandelkwab en de aangrenzende kwab.

Meting van lekkage tussen kwabben

Voordat de ventielen geplaatst worden, zal er eerst gemeten worden of er geen lekkage is tussen de behandelkwab en de aangrenzende kwab. Dit wordt gemeten tijdens een bronchoscopie met het "Chartis systeem". De meting duurt circa 15 minuten.

Tijdens de bronchoscopie wordt er een katheter met aan het uiteinde een ballon geplaatst in de ingang van de behandelkwab. De katheter is aangesloten aan een meetapparaat die de luchtstroom meet. De ballon wordt opgeblazen, waardoor er geen lucht meer in de behandelkwab kan gaan. Via de katheter kan er nog wel lucht uit de behandelkwab stromen. Indien er geen lekkage is dan zal de lucht stroom uit de behandelkwab binnen circa 6 minuten afnemen en uiteindelijk helemaal stoppen. Indien er wel lekkage is dan zal er continue luchtstroom uit de katheter komen.

Indien er **wel lekkage** is tussen de behandelkwab en aangrenzende kwab dan worden er **geen ventielen** geplaatst.


Indien er **geen lekkage** is tussen de behandelkwab en aangrenzende kwab dan worden de ventielen geplaatst.

Plaatsing van de ventielen

De ventielen worden tijdens dezelfde bronchoscope direct na de Chartis meting geplaatst. Met behulp van een katheter worden de ventielen geplaatst in de ingang van de te behandelen longkwab. Er worden circa 4 ventielen geplaatst, afhankelijk van de bouw van de luchtwegen. De hoeveelheid ventielen heeft geen relatie met het uiteindelijke effect en de complicaties. De plaatsing duurt circa 15 minuten.









In dit plaatje hierboven zijn in de ingang van de behandelkwab totaal 3 ventielen geplaatst. In het plaatje hieronder wordt stap voor stap weergegeven hoe een ventiel geplaatst wordt in een luchtwegtakje.



4. Uitkomsten van de behandeling met ventielen

Resultaten en complicaties

In de tabel hieronder staan de resultaten en complicaties in het eerste jaar na de behandeling met ventielen en deze worden vergeleken met een groep die de behandeling niet heeft ondergaan maar wel optimaal behandeld wordt voor emfyseem.

		Behandeling met eenrichtingsventielen	Optimale behandeling voor emfyseem
RESULTATEN	<i>In het komende jaar kans op een significante verbetering in:</i>		
	Longinhoud <i>(meer dan 400mL verbetering in Residuaal Volume)</i>	 64 van de 100 mensen	 22 van de 100 mensen
	Inspanningsvermogen <i>(meer dan 26 meter verbetering op de 6-minutenwandtest)</i>	 60 van de 100 mensen	 20 van de 100 mensen
	Kwaliteit van leven <i>(meer dan 7 punten verbetering op de SGRQ-kwaliteit van leven vragenlijst)</i>	 56 van de 100 mensen	 30 van de 100 mensen
Complicaties	<i>In het komende jaar kans op een:</i>		
	Klaplong	25%	1%
	COPD aanval waarvoor ziekenhuisopname	30%	35%
	Overlijden	4%	4%

Complicaties gerelateerd aan de narcose

De anesthesioloog zal tijdens het consult alle risico's met u bespreken. Risico's in verband met de narcose, zijn onder andere allergische reactie op de medicatie, misselijkheid of braken, hoofdpijn, pijn in de keel vanwege het beademingsbuisje, pijn of blauwe plekken op de plaats waar het infuus in uw arm wordt gebracht, wazig of dubbel zien, koorts en ademhalingsproblemen.

Complicaties gerelateerd aan de bronchoscopie

De risico's van een routinematige bronchoscopie worden in het algemeen als zeer laag beschouwd. Voorkomende complicaties zijn o.a. bloeden, infectie, koorts, bronchospasme (samentrekking van de spieren in de longwand), laryngospasme (samentrekking van de spieren in de keel), hypoxie (laag zuurstofgehalte in het bloed), aritmie (abnormale hartslag), keelpijn of droge keel en lippen, lage of hoge bloeddruk, klaplong, perforatie (gaatje) van de long en mogelijk overlijden.

Complicaties gerelateerd aan de Chartis meting

Het risico op ernstige problemen met het Chartis-systeem wordt als zeer laag beschouwd. Bijkomende risico's die mogelijk door de Chartis-katheter worden veroorzaakt zijn o.a. perforatie (gaatje) in de luchtweg, infectie of koorts, verergering van COPD (toename van symptomen als u COPD hebt) en bloeden of irritatie op de plek in de luchtweg waar de ballon wordt gevuld.

Complicaties gerelateerd aan de behandeling met ventielen

Korte termijn:


Als gevolg van de plaatsing van ventielen, is de verwachting dat de behandelde kwab kleiner gaat worden. Dit kleiner worden van de long kan gepaard gaan met pijn tijdens de ademhaling, een pijnlijk gevoel op de borst, hoestklachten en tijdelijk meer kortademigheid. Ook kan het voorkomen dat u een aantal dagen een heel klein beetje bloed in uw sputum aantreft. Ook kan ten gevolge van het kleiner worden van de behandelkwab kan een klaplong ontstaan.

Klaplong

Het risico op een klaplong (in medische term pneumothorax) is vrij groot. Bij 4 patiënten die behandeld zijn met ventielen krijgt 1 patiënt een klaplong en 3 patiënten niet. De klaplong ontstaat meestal (in ongeveer 76 van de 100 gevallen) binnen 3 dagen nadat de ventielen geplaatst. Na deze periode loopt de kans op een klaplong af. Vanwege het risico op een klaplong verblijft u te minste 3 nachten na de behandeling met ventielen ter observatie in het UMCG.

Wat is een klaplong?

De longen en de borstkas zijn beiden omgeven door een vlies. Onder normale omstandigheden glijden deze vliezen soepel langs elkaar tijdens het ademen. De long is een elastisch orgaan, dat de neiging heeft samen te vallen. Door de negatieve druk in de borstholte blijft de long ontplooid. Als de negatieve druk wegvalt (door een gaatje in de long of de borstkas), valt de long samen. Dit wordt een klaplong genoemd. De borstholte vult zich dan met lucht, die zich tussen de long en de borstkaswand bevindt.



Wat zijn de klachten bij een klaplong?

Een klaplong kan gepaard gaan met hevige pijn op de borst, een moeizame ademhaling en kortademigheid. De pijn wordt meestal gevoeld aan de rugzijde, ter hoogte van de schouderbladen. Na enige tijd kan de kortademigheid verminderen, doordat het lichaam zich instelt op het ademen met één long.

Hoe wordt een klaplong behandeld?

Er zijn verschillende behandelingen van de klaplong.

1. Observatie

Dit komt bij ongeveer 30 van de 100 patiënten met een klaplong voor. Indien u geen of nauwelijks klachten heeft en u medisch stabiel bent dan zal er een observatie beleid zijn. Dit betekent dat u mogelijk meer dan 3 nachten na de behandeling met ventielen in het UMCG verblijft en dat er regelmatig een longfoto van de longen gemaakt wordt om na te gaan of de klaplong vanzelf herstelt.

2. Plaatsen van een drain

Dit komt bij ongeveer 70 van de 100 patiënten met een klaplong voor. Indien u een klaplong heeft met daarbij benauwdheids klachten dan zal er een drain (dun slangetje) worden door de longarts. De drain wordt onder plaatselijke verdoving ingebracht tussen 2 ribben en komt in de borstholte te liggen, waardoor de lucht uit de borstholte kan ontsnappen. Dit betekent dat u in ieder geval meer dan 3 nachten en soms een aantal weken na de behandeling met ventielen in het UMCG verblijft en dat er regelmatig een longfoto van de longen gemaakt wordt om na te gaan of de klaplong vanzelf herstelt.

3. Plaatsen van een drain + verwijderen van een ventiel

Dit komt ongeveer bij 35 van de 100 patiënten met een klaplong voor. Indien er veel lucht uit de drain blijft komen, dan kan er onder narcose één of meerdere ventielen tijdelijk verwijderd worden. Door het verwijderen van het ventiel kan de long weer ontplooiën waardoor de herstel van de klaplong versneld zal worden. Bij ongeveer 70 van de 100 patiënten met een klaplong waarbij een ventiel verwijderd is zal ongeveer 8 weken na herstel van de klaplong het ventiel terug geplaatst worden. De kans op een klaplong na het terugplaatsen is nog steeds aanwezig echter aanzienlijk kleiner. Bij 30 van de 100 patiënten zal dit niet mogelijk zijn omdat het genezings proces van de

klaplong te langdurig is geweest of wanneer het risico op herhaling medisch onverantwoord is. In dat geval is verdere behandeling met ventielen niet mogelijk.

Complicaties gerelateerd aan de behandeling met ventielen

Lange termijn:

Bij ongeveer 20 van de 100 patiënten kan het effect van de ventielen (gedeeltelijk) verdwijnen in het eerste jaar na de behandeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: verplaatsing van het ventiel, longontsteking, bloeding in de long, granulatie (ontstekings-weefselvorming), meer kortademigheid, blijvende hoestklachten, en langdurende of snel terugkerende COPD exacerbaties ("long-aanval"). Wanneer u qua klachten, zonder dat er een infectie aanwezig is, weer op het niveau zit van vóór de behandeling met ventielen zal er een longfoto of een CT scan gemaakt worden om na te gaan of de behandelkwab nog steeds in volume is afgenomen.

Indien het blijkt dat de behandelkwab weer groter is geworden zal er in overleg met een nieuwe bronchoscopie onder narcose gepland worden. Tijdens de bronchoscopie zal worden nagegaan of er een oorzaak is van uw klachten. In sommige gevallen zal een ventiel verwijderd worden en tijdens dezelfde bronchoscopie vervangen worden door 1 of 2 nieuwe ventielen, of er zal een ventiel verwijderd worden en na circa 3 maanden weer terug geplaatst worden of alle ventielen zullen verwijderd worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat vanwege deze redenen bij ongeveer 10 van de 100 patiënten 1 jaar na de behandeling de ventielen definitief zijn verwijderd.

Alternatieven voor een behandeling met ventielen

Andere opties voor behandeling van uw emfyseem zijn: doorgaan met en/of aanscherpen van uw huidige medische behandeling zoals: stoppen met roken, inhalatie medicijnen, onderhoud behandeling met medicijnen als antibiotica of morfine, nachtelijk kap-beademing, voedingssupplementen, zuurstof, fysiotherapie en/of het volgen van een longrevalidatie programma.

Er zal door het bronchoscopisch interventie team ook nagegaan worden of u in aanmerking komt voor een andere bronchoscopische behandeling van uw COPD als bijvoorbeeld bronchoscopische long volume reductie behandeling met coils of een behandeling waarbij de nervus vagustakjes in de luchtwegen wordt uitgeschakeld. Deze behandelingen kunnen alleen uitgevoerd worden in een onderzoek en als u voldoet aan de studievoorwaarden.

Daarnaast zijn er ook twee invasieve chirurgische behandelingen beschikbaar. Een longtransplantatie of longvolume reductie chirurgie. Longtransplantatie is voor een klein deel van de emfyseem patiënten mogelijk. Deze behandeling is erg 'zwaar' (belastend voor uw gezondheid), u moet voldoen aan een groot aantal voorwaarden en omdat er is een tekort aan beschikbare donorlongen. Als u op dit moment gescreend wordt voor longtransplantatie of hiervoor op de wachtlijst staat, is dit geen belemmering voor de behandeling met ventielen. Zodra er een donorlong voor u beschikbaar is, kunt u getransplanteerd worden.

Long volume reductie chirurgie is een grote operatie die uitgevoerd wordt door een thoraxchirurg. Chirurgie is voor veel emfyseem patiënten niet mogelijk omdat u moet voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Bij longvolume reductie chirurgie wordt een groot deel van uw longweefsel verwijderd, dit vereist een langdurige verblijf in het ziekenhuis en een langdurige herstelperiode.

5. Opname in het UMCG

U verblijft circa 4 nachten in het ziekenhuis, indien u graag tijdens deze periode uw partner/kinderen dichtbij u heeft is het mogelijk om in een kamer te verblijven van het 'Familiehuis'. Het familiehuis is gevestigd in het NH hotel tegenover het UMCG. Indien u wilt, dan kunnen wij voor u kamer reserveren (e-mail Gea Zwart, secretaresse: g.zwart@umcg.nl) tijdens de opnameperiode (onder voorbehoud van beschikbaarheid). De kosten voor een overnachting voor een 2 persoonskamer (exclusief ontbijt) bedragen ± € 49,- per nacht per kamer. U kunt bij uw zorgverzekeraar vooraf aan uw opname navragen of u in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in verblijf- en reiskosten. In de opname brief treft u hier informatie over aan.

Dag 1

U wordt een dag voor de behandeling opgenomen op verpleegafdeling D3VA of E4VA van het UMCG. Tijdens deze dag staan er mogelijk een aantal onderzoeken gepland zoals bijvoorbeeld een looptest, longfunctie en longfoto. Daarnaast heeft u een opnameconsult met de longarts. Tijdens dit consult wordt de behandeling met ventielen en de risico's nogmaals met u besproken en wordt de toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst ondertekend. In verband met de narcose krijgt u ook een consult met de anesthesioloog. De anesthesioloog zal de risico's van de narcose met u bespreken en aangeven vanaf welk tijdstip u nuchter moet zijn.

Dag 2

De bronchoscopie staat tussen 08.00 en 14.00 uur gepland. Een verpleegkundige brengt u naar het endoscopiecentrum. U verblijft eerst gedurende een korte tijd op de observatie wachtkamer en vervolgens wordt u naar de behandelkamer gebracht. U komt op een behandeltafel te liggen. U krijgt een infuus in uw arm, er worden plakkers op uw borst geplakt om uw hart te bewaken, u krijgt een plakstrip op uw voorhoofd om de diepte van uw slaap te kunnen meten, er wordt een zuurstofmeter geplaatst op uw vinger en u krijgt een bloeddrukband om uw arm. Als u een kunstgebit heeft, zal deze vlak voordat u in slaap wordt gebracht verwijderd worden. U krijgt een slaapmiddel via het infuus ingespoten. Zodra u in slaap bent wordt een beademingsbuisje ingebracht. Deze gaat via uw keel in uw luchtpijp en wordt aangesloten op de beademingsmachine. De longarts brengt dan de bronchoscoop door het beademingsbuisje in de luchtwegen. De longarts zal eerst een algemene inspectie doen van de luchtwegen en er wordt een beetje slijm opgezogen wat op kweek gezet zal worden. Indien er veel slijm en/of ontstekingen zijn in de luchtwegen kan het voorkomen dat de longarts besluit niet verder te gaan met de behandeling, omdat in dit geval een behandeling met ventielen alleen maar een verergering van ontstekingen kan geven. Indien er geen bijzonderheden zijn dan zal eerst de Chartis meting uitgevoerd worden. Indien er geen lekkage is worden de ventielen direct geplaatst. Wanneer de longarts klaar is wordt u weer wakker gemaakt. U bent ongeveer 1 uur op de behandelkamer.

Nadat u wakker bent brengt de anesthesioloog u naar de uitslaapkamer. Op de uitslaapkamer wordt u goed in de gaten gehouden door de verpleegkundige. Er zal voordat u terug gaat naar de verpleegafdeling een longfoto worden gemaakt om na te gaan of er geen klaplong is. U verblijft ongeveer 2 uur op de uitslaapkamer, daarna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. 's Middags komt de longarts langs en zal uitleg geven over de behandeling. Vanwege het risico op een klaplong is het belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet en op uw kamer blijft. De longarts zal dit met u bespreken. U krijgt ook een rood bandje om uw pols waarop staat dat u ventielen heeft gekregen en dat u een verhoogd risico heeft op een klaplong.

Indien er geen ventielen geplaatst zijn en u bent medisch stabiel dan beslist de longarts of u diezelfde dag nog naar huis kunt. U mag zelf niet autorijden.

Dag 3

's Ochtends wordt er een longfoto gemaakt en aan het einde van de ochtend zal de longarts langskomen om met u de uitslag van de foto te bespreken en aan te geven wat u weer mag doen. Om de conditie op peil te houden is het belangrijk dat u niet de hele dag in bed ligt, maar aan de tafel gaat zitten tijdens het eten en drinken. Daarnaast kunt u op de afdeling zelf ook rondlopen (u kunt uw rollator meenemen).

Dag 4

De longarts zal visite lopen.

Dag 5

's Ochtends wordt er een longfoto gemaakt en aan het einde van de ochtend zal de longarts langskomen om te beoordelen of u naar huis mag. Indien u naar huis mag dan krijgt u van de longarts 'leefregels' mee. Deze 'leefregels' worden ook vermeld in deze informatiefolder. Een reden waarom u langer moet blijven kan zijn dat het risico op een klaplong te hoog is. Indien u niet naar huis mag dan zal de longarts dit met u bespreken en aangeven wanneer u mogelijk wel naar huis mag.

Berichtgeving van uw opname

Zowel uw huisarts als uw eigen longarts ontvangen een brief van uw opname in het UMCG.

6. Na de behandeling met ventielen

Mogelijke klachten na de behandeling

Pijnklachten

Het kleiner worden van de behandelde longkwab kan de eerste dagen gepaard gaan met een pijnlijk en trekkend gevoel op de borst en in de rug en/of schouderbladen. De pijn verdwijnt meestal na een aantal dagen. De longarts zal tijdens de opname pijnmedicatie voorschrijven indien nodig. Mocht u na de opname ook nog pijnklachten ervaren dan kunt u tegen de pijn 2 tabletten paracetamol van 500 mg per 6 uur innemen.

Kortademigheid

De eerste paar weken kunt u iets meer kortademig zijn dan u gewend bent. De kortademigheid wordt veroorzaakt doordat de doorbloeding in de behandelde longkwab tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Gemeten zuurstofwaarden kunnen daarom iets lager zijn dan u gewend bent. Het kan zijn dat u tijdens de opname vanwege een lager zuurstof waarde tijdelijk extra zuurstof via een neusbrilletje toegediend krijgt. Na ± 4 weken zal de doorbloeding genormaliseerd zijn.

Rood gekleurd sputum

De eerste paar weken kan het voorkomen dat er een klein beetje bloed in het sputum zit, dit is normaal.

Neem contact met ons op als een van de volgende klachten de eerste week na uw ontslag uit het ziekenhuis zijn ontstaan:

- plotseling of een toegenomen hoeveelheid bloed (>1/2 kopje) in het sputum heeft
- plotselinge, of erger geworden heftige hoestklachten
- koorts (gemeten hoger dan 38.5°C)

Bel **112** indien u één van de volgende klachten heeft na ontslag:

- plotselinge, heftige pijn op de borst
- plotselinge, heftige kortademigheid

Geef **direct** aan de telefoniste door dat het mogelijk om een “**klaplong gaat bij een ernstige COPD patiënt**”.

Geef in het ziekenhuis aan dat u een longvolume reductie behandeling hebt ondergaan met ventielen en dat er contact opgenomen kan worden met een medewerker van het bronchoscopisch interventie centrum UMCG.

We zijn te bereiken op **Tel. 050-3619194** gedurende werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur. In geval van spoed medische vragen kan buiten de kantoor tijden het algemene nummer van het UMCG Tel. 050-3616161 gebeld worden, er kan dan gevraagd worden naar de dienstdoende longarts.

Leefregels na ontslag

Thuis

Probeer het de eerste week thuis rustig aan te doen. Blijf wel rustig in beweging maar probeer niet uw grenzen op te zoeken. Indien u moet hoesten probeer dit niet te voorkomen; hoesten mag gewoon. Probeer echter niet teveel kracht te zetten. Probeer bij de toiletgang persen te voorkomen en u mag de eerste 4 weken geen zware dingen tillen.

Medicatie

De kuur medicatie die in het ziekenhuis is gestart moet u thuis afmaken. Heeft u na het stoppen van de kuur nog steeds meer klachten dan voorheen, neem dan met ons contact op.

Fysiotherapie/Sporten

Na één week kunt u de fysiotherapie/training weer oppakken. Vermijdt de eerste 4 weken wel krachtoefeningen met uw armen en schoudergordel en bouw dit hierna weer rustig op. Probeer vooral niet uw grenzen op te zoeken, dit kan een verergering van klachten geven.

Werkzaamheden

Na ontslag uit het UMCG kunt u uw werkzaamheden weer oppakken. U mag de eerste 4 weken niet zwaar tillen en geen zwaar huishoudelijk werk waarbij de armen zwaar belast worden uitvoeren. Probeer hierbij ook niet over uw grenzen te gaan.

Vliegen

Als u van plan bent in de komende maanden te gaan vliegen is het raadzaam dit eerst te overleggen met een van de longartsen van het bronchoscopisch interventie team. De eerste 4 weken na de behandeling wordt vliegen afgeraden.

Leefregels na ontslag bij een klaplong

Er is geen bezwaar tegen snelle hervatting van zittend werk. Gedurende zes weken mag u niet zwaar tillen, geen zwaar huishoudelijk werk uitvoeren. Als u wilt vliegen dient u dit eerst te overleggen met de longarts van het UMCG. U mag wel rustig sporten en uw conditie mag wel langzaam opgebouwd worden. Duiken met perslucht mag de rest van uw leven niet meer, snorkelen mag wel. De pijnklachten kunnen nog een aantal weken aanhouden. Belangrijk is dat u niet perst bij de toiletgang gedurende ongeveer zes weken. Als u na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt dient u contact op te nemen met een medewerker van het bronchoscopisch interventie centrum UMCG Tel. 050-3619194 (gedurende werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur), buiten kantoortijden kunt u het algemene nummer van het UMCG bellen Tel. 050-3616161 en vragen naar de dienstdoende longarts.

In **noodgevallen** dient u altijd eerst **112** te bellen.

Controle visites in het UMCG

In het eerste jaar komt u na circa 6 weken, 6 maanden en 12 maanden in het UMCG voor een controle visite met een aantal onderzoeken. Vervolgens wordt u ieder jaar tot 5 jaar na de behandeling met ventielen uitgenodigd. Zowel uw huisarts als uw eigen longarts ontvangen een brief van uw controlevisite in het UMCG. Voor vragen betreffende uw afspraak kunt u contact opnemen met Gea Zwart Tel. 050-3619194 (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag).

7. Contact

We zijn te bereiken op **Tel. 050-3619194** gedurende werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur. In geval van spoed medische vragen kan buiten de kantoortijden het algemene nummer van het UMCG Tel. 050-3616161 gebeld worden, er kan gevraagd worden naar de dienstdoende longarts.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail te bereiken. Graag altijd uw voornaam, achternaam en uw geboortedatum vermelden in uw e-mail.

Algemene vragen

Gea Zwart E-mail g.zwart@umcg.nl

Medische vragen

Karin Klooster E-mail k.klooster@umcg.nl

Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC)

Sonja Augustijn, onderzoeks medewerker en longfunctie analiste

Gea Zwart, secretaresse

Drs. Jorrit Welling, arts en onderzoeker

Drs. Marieke van der Molen, arts en onderzoeker (SOLVE studie)

Drs. David Koster, longarts


Drs. Marlies van Dijk, longarts

Dr. Jorine Hartman, onderzoeker en studie-coördinator

Dr. Nick ten Hacken, longarts

Dr. Dirk-Jan Slebos, longarts en medisch hoofd BIC

Dr. Karin Klooster, onderzoeker en studie-coördinator en coördinator BIC



Bronchoscopisch Interventie Centrum

Universitair Medisch Centrum Groningen

Afdeling Longziekten Huispostcode AA11

Hanzeplein 1, 9713 GZ te GRONINGEN

Tel. 050-3619194 E-mail: k.klooster@umcg.nl

www.bicumcg.nl